

El cotoneaster

Cotoneaster interregima, Cotoneaster microphylla, Cotoneaster horizontalis.

Familia: Rosaceae.

Origen: Europa, Africa del Norte, Asia.

Los membrillos falsos tienen unas hojas pequeñas y redondas. Dependiendo de la especie, son siempre verdes, semi perennes o caducos. Las flores son blancas o ligeramente rojas con frutos rojos u oscuros. El membrillo verde es normalmente utilizado para cubrir grandes zonas de jardines; ideal para esto es el cotoneaster horizontalis. Estas plantas son muy adecuadas como bonsáis para los que se inician en este arte, ya que tiene de origen hojas pequeñas y un tronco fácilmente modelable. El crecimiento es muy rápido por lo que en seguida se aprecian los primeros resultados.

Poda y limpieza: Eliminar hojas, flores y frutas secas. Si la planta ha echado mucho fruto, se deben quitar parcialmente para no debilitarla. En el mes de junio se deben reducir las ramas nuevas a solamente dos nudos. En los meses de marzo y septiembre se vuelven a podar las ramas para darle al árbol un aspecto denso y compacto. Es en marzo cuando se le aplica la poda de modelado, reduciendo las ramas principales con cortes siempre oblicuos.

Temperatura and exposición: Soportan tanto estaciones muy calurosas como muy frías. Al igual que las plantas plantadas en el jardín mi bonsáis siempre pasan el invierno afuera donde han soportado temperaturas por debajo de -6° centígrados. Lo que sí que se puede hacer es protegerlos de los fríos vientos invernales.

Replantado / Tierra: Se suelen transplantar cada dos o tres años (debido a su rápido crecimiento) cortando al menos una tercera parte de las raíces. No son muy sensibles en lo que se refiere a la tierra, yo recomiendo la mezcla estándar de 1/3 de tierra vegetal, 1/3 de humus y 1/3 de arena de río. Como siempre, se debe asegurar un buen drenaje, en especial en macetas tan altas como la mostrada en la fotografía de arriba. Personalmente me gustan mucho las macetas de arcilla oscura (al menos para el estilo Kengai) para crear un contraste entre las flores claras y las hojas verde oscuras.

Alambrado: Es importante alambrear las ramas principales y el tronco antes de que aparezcan los abundantes brotes. En estos árboles siempre se debe utilizar raffia para proteger las frágiles (blandas) ramas que en seguida se quedan marcadas con feas cicatrices.

Luz: El membrillo falso necesita luz solar directa, pero puede permanecer en la semisombra. Sin embargo se resentirá el crecimiento si no reciben suficiente insolación.

Riego: Aguar frecuentemente ya que el crecimiento es muy activo y por lo tanto consume mucha agua. Cuidado con no inundar la tierra pero si es importante mantenerla siempre húmeda. Es conveniente dejar que se seque la tierra entre riegos, en caso contrario las raíces podrían pudrirse parcialmente. Si se vaporiza la planta a menudo se incrementará el ritmo de crecimiento además de evitar afecciones por parásitos.

Abono: Siempre utilizo fertilizante orgánico sólido y lo aplico en primavera y otoño, no aplicándolo en verano. De esta forma se asegura un crecimiento constante sin sobrealimentar la planta.

Enfermedades: La única plaga que sin embargo se repite prácticamente todos los años son los pulgones que afortunadamente son fáciles de combatir ya que los elimini manualmente. Si esto no fuera suficiente, sumergo el árbol entero durante algunas horas. Si persiste la plaga, aplicar una dosis muy suave de Folithion antipulgón.